

Une **mammographie**
peut sauver une vie



CONTACT

@ contact@cse-radiologie.com

📞 01.42.38.66.66

🌐 www.cse-radiologie.com



CSE

Imagerie Médicale
13&18, rue Beaurepaire
75010 PARIS



Prenez votre rendez-vous sur
Doctolib.fr

QUE FAIRE APRES UNE BIOPSIE DU SEIN

QUELS SOINS APRES LA BIOPSIE GUIDEE ?

- En arrivant à votre domicile, appliquer sur le pansement un sachet de gel réfrigérant, sur la zone du pansement, pendant 2 heures, en gardant un vêtement et non directement sur la peau.
- Garder le pansement adhésif transparent, posé après la procédure, pendant 4 jours.
- Ne pas prendre de bain, mais préférer la douche.
- Se doucher en évitant de diriger le jet de la douche directement sur le pansement.
- Ne pas prendre d'ASPIRINE, ou tout autre produit anticoagulant, antiagrégant plaquettaire, pendant 24 h.
- Ne pas fournir d'efforts physiques importants, tels que des activités sportives, ménagères ou professionnelles, pendant 48 heures pour éviter la constitution d'un hématome.
- Le 5^{ème} jour, vous pouvez ôter le pansement semi-perméable.
- Les bandelettes adhésives stériles, de sutures cutanées (Steri-Strip®), tomberont seules, sous la douche.
- Les bains en piscine ou à la mer doivent être exclus pendant une semaine.
- En dehors de ces précautions, il n'y a aucun impact sur les activités quotidiennes habituelles.

QUE FAIRE EN CAS DE MAJORATION DES DOULEURS ?

- Appliquer de nouveau, sur le pansement, en gardant le vêtement, un sachet de gel réfrigérant, pendant 3 heures, efficace par son effet antalgique, son action anti-inflammatoire, anti-hémostatique.
- Prendre éventuellement un antalgique à base de paracétamol, type Doliprane®, Dafalgan® ou Efferalgan®.
- Attention, l'ASPIRINE et ses dérivés sont contre-indiqués, sauf avis contraire du cardiologue !

CET EXAMEN COMPORTE-T-IL DES RISQUES ?

- Tout acte médical invasif sur le sein comporte un risque de complication, heureusement rare et sans gravité, dans la plupart des cas.
- Après la biopsie une ecchymose (ou bleu) peut apparaître, qui se dissipera spontanément en quelques jours.
- Plus rarement, un hématome peut survenir, sous la forme d'une boule sous-cutanée, qui va se résorber généralement en quelques semaines.
- En cas d'apparition d'un gonflement localisé du sein ou d'un saignement : appeler notre secrétariat avant 18h00, qui vous mettra en contact avec le médecin qui a réalisé l'examen.

N'hésitez pas à nous poser vos questions au 01.42.38.66.66 ou par mail à contact@cse-radiologie.com.

